MAXIM® XL

Fungicida

Suspensión concentrada para tratamiento de semillas

ACCIÓN FITOSANITARIA: Fungicida de amplio espectro para tratamiento de semillas de maíz.
NOMBRE COMÚN: Fludioxonil + Metalaxil-M
FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Suspensión concentrada para tratamiento de semillas que contiene 25 g de Fludioxonil y 10 g de Metalaxil-M por litro de producto comercial.
MECANISMO DE ACCIÓN:. Fludioxonil inhibe el desarrollo del micelio e induce una reducción instantánea de la absorción de los aminoácidos y azúcares. Metalaxil-M inhibe los patógenos del orden peronosporales al interferir de manera selectiva con la síntesis de ARN ribosomal.

MODO DE EMPLEO: Agitar bien el envase antes de utilizar el producto. Aplicar **Maxim® XL** diluido en agua.
La proporción recomendada (para la dosis a utilizar) es 1 parte de **Maxim® XL** en 2.0 – 4.5 partes de agua; siendo la más optima la de 1 parte de **Maxim® XL en 3.5** partes de agua (el volumen de mezcla final recomendado para maíz es de 600 – 1200 ml/100 kg de semilla)
Para la preparación, echar la cantidad de **Maxim® XL** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua.
Tan pronto se tenga la mezcla preparada, proceder a mezclar el producto con las semillas, ya sea dentro del equipo tecnificado, del cilindro o tambor rotatorio o de la funda plástica.

PERÍODO DE REINGRESO: No aplica.
FITOCOMPATIBILIDAD: Maxim® XL es compatible con los productos de recubrimiento de película y con formulaciones SL / WS de otros compuestos del tratamiento de semillas con acción neutra. **Maxim® XL** no es compatible con formulaciones a base de solventes orgánicos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evitar la ingestión del producto.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE USO DE MAXIM® XL:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (ml/kg semilla)	P.C. (días)
	Nombre Común	Nombre Científico		
MAÍZ (*Zea mays*)	Fusarium	*Fusarium moniliforme*	2	N.A.

P.C.: Período de carencia **N.A.:** No aplica

FRASES DE ADVERTENCIA:

- No contaminar cuerpos de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.
- No almacenar junto con alimentos, bebidas o semillas para consumo humano o animal.
- Evite almacenar a temperaturas por encima de 35 °C.
- Mantener limpio y en buenas condiciones el equipo utilizado para la aplicación, cuidando de que no se produzcan escapes ni contaminación externa.

- En caso de derrame, recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Suministre repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.

TRATAMIENTO: No existe antídoto específico. Usar tratamiento sintomático.
TOXICIDAD: Categoría Toxicológica II. Moderadamente peligroso.

EN CASO DE EMERGENCIA SI ESTÁ EN LAS PROVINCIAS DE: BOLÍVAR, CARCHI, CHIMBORAZO, COTOPAXI, ESMERALDAS, IMBABURA, NAPO, ORELLANA, PASTAZA, PICHINCHA, TUNGURAHUA Y SUCUMBÍOS LLAMAR A CISPROQUIM: 1-800593005 Ó (00571) 2886012. PARA EL RESTO DEL PAÍS: CISPROQUIM: (00571) 2886012 ó CIATOX a nivel nacional: 1800 836366.

REGISTRO N°: 167 – F1 / NA
Distribuido por: AGRIPAC